

INPORO
ALBIT
HOUBOVÉ CHOROBY

**POMOCNÝ
PROSTŘEDEK NA
OCHRANU ROSTLIN**

Prostředek **INPORO Albit Houbové choroby** ve formě rozpustného koncentrátu (SL) obsahuje účinnou složku **kyselinu poly-betahydroxymáselnou**.

INPORO Albit Houbové choroby je určen k podpoře zdravotního stavu všech polních plodin, ovocných dřevin a zeleniny, k posílení imunity a proti širokému spektru houbových chorob. Zejména k zvýšení odolnosti rostlin proti chorobám a zlepšení kvality produkce.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Prostředek je vhodný k použití v integrovaných systémech ochrany rostlin.




AgroBio
OPAVA

www.agrobio.cz

AgroBio
OPAVA

NOVINKA

INPORO
ALBIT
HOUBOVÉ CHOROBY

**POMOCNÝ
PROSTŘEDEK NA
OCHRANU ROSTLIN**

 **mayline**

Pomocný prostředek na ochranu rostlin **INPORO Albit houbové choroby** se používá k podpoře zdravotního stavu a zvýšení odolnosti rostlin proti houbovým chorobám. Půdní aplikace výrazně podporuje rozvoj mikroflory přátelské k pěstovaným rostlinám a podle mnohaletých výsledků významně omezuje hlavně houby typu Peronosporaceae, tj. houby typu perenospóry. Dávkování 3 ml/3 litry vody/100 m². Při foliární aplikaci vhodné provést následnou aplikaci za 3-4 týdny po první aplikaci (i opakovaně v průběhu vegetace, pokud není uvedeno jinak).



RAJČATA

Dávka přípravku: 0,4 ml | **Objem vody:** 1,5 - 2,5 L | **Plocha:** 100 m² | **Další údaje k aplikaci od:** co nejdříve po výsadbě
Škodlivý organismus: Fytoftorové vadnutí rajčete, alternariová a septoriová skvrnitost listů rajčete, padlí rajčete



PAPRIKA

Dávka přípravku: 0,4 ml | **Objem vody:** 1,5 - 2,5 L | **Plocha:** 100 m² | **Další údaje k aplikaci od:** co nejdříve po výsadbě
Škodlivý organismus: Houbové vadnutí, peronospora aj. listové a stonkové choroby. Aplikace spolu s CaNO₃ brání všem chorobám plodů rajčete a papriky



BRAMBORY

Dávka přípravku: 1 ml | **Objem vody:** 1,5 - 2,5 L | **Plocha:** 100 m² | **Další údaje k aplikaci od:** od výšky rostlin 10-15cm
Škodlivý organismus: Hnědá a terčovitá skvrnitost bramboru, obecná strupovitost bramboru, kořenomorka bramborová, plíseň bramboru



PŮR, CIBULE, ČESNEK

Dávka přípravku: 0,4 ml | **Objem vody:** 1,5 - 2,5 L | **Plocha:** 100 m² | **Další údaje k aplikaci od:** při výšce cca 10 cm
Škodlivý organismus: Fuzariová hniloba cibule, plíseň cibulová



KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA (kedlubny, kapusta, brokolice, květák, zelí)

Dávka přípravku: 0,5 ml | **Objem vody:** 1,5 - 2,5 L | **Plocha:** 100 m² | **Další údaje k aplikaci od:** 2-4 pravé listy, nebo ihned po výsadbě
Škodlivý organismus: Bakteriální hniloby částí rostlin určených k jídlu, houbové zahnívání listů a vnitřních částí květů



KOŘENOVÁ ZELENINA (mrkev, petržel, celer)

Dávka přípravku: 0,3 ml | **Objem vody:** 1,5 - 2,5 L | **Plocha:** 100 m² | **Další údaje k aplikaci od:** 2-4 pravé listy (celer ihned po výsadbě)
Škodlivý organismus: Alternariová skvrnitost mrkve, padlí miřkovitých, septoriová skvrnitost celeru



RÉVA VINNÁ

Dávka přípravku: 2,0 ml | **Objem vody:** 2,5 - 3,5 L | **Plocha:** 100 m² | **Další údaje k aplikaci od:** tvorba květenství-začátek kvetení (až 5x za sezonu, nejlépe v kombinaci s fungicidy - tankmix)
Škodlivý organismus: Plíseň révy, padlí révy, šedá hniloba hroznů révy



HRÁCH

Dávka přípravku: 0,4 ml | **Objem vody:** 1,5 - 2,5 L | **Plocha:** 100 m² | **Další údaje k aplikaci od:** od výšky rostlin 5-10cm
Škodlivý organismus: Kořenové hniloby, bílá hniloba hrachu, plíseň hrachu, šedá plísňovitost hrachu



JAHODNÍK

Dávka přípravku: 0,4 ml | **Objem vody:** 1,5 - 2,5 L | **Plocha:** 100 m² | **Další údaje k aplikaci od:** před kvetením (co nejdříve na jaře)
Škodlivý organismus: Plíseň šedá, fytophtorová hniloba rhizomů a plodů jahodníku, padlí jahodníkové



TRÁVNÍK

Dávka přípravku: 0,5 - 1,0 ml | **Objem vody:** 3,5 - 10,0 L | **Plocha:** 100 m² | **Další údaje k aplikaci od:** při obnově jarní vegetace
Škodlivý organismus: Plíseň sněžná a paluška na travinách, padlí, (rzi)



KVĚTINY ZAHRADNÍ

Dávka přípravku: 0,4 ml | **Objem vody:** 1,5 - 2,5 L | **Plocha:** 100 m² | **Další údaje k aplikaci od:** po výsadbě, trvalky před kvetením
Škodlivý organismus: Padlí, tmavé (černé) skvrnitosti listů, plíseň šedá na květech



KVĚTINY POKOJOVÉ

Dávka přípravku: 0,6 ml | **Objem vody:** 1,5 - 2,5 L | **Plocha:** 100 m² | **Další údaje k aplikaci od:** v období duben-říjen (co 6-8 týdnů, max. 5x za sezonu)
Škodlivý organismus: Padlí, tmavé (černé) skvrnitosti listů



BOBULOVINY (rybíz, angrešt, maliny, ostružiny...)

Dávka přípravku: 0,6 ml | **Objem vody:** 1,5 - 2,5 L | **Plocha:** 100 m² | **Další údaje k aplikaci od:** před květem
Škodlivý organismus: Plíseň šedá, padlí a omezuje americké padlí



RAKYTNÍK

Dávka přípravku: 3 ml na půdu + 1 ml na list | **Objem vody:** 3L + 1,5 - 2,5 L | **Plocha:** 100 m² | **Další údaje k aplikaci od:** před kvetením
Škodlivý organismus: Náročné, protože nejvíce škodí peronospóry – aplikace na půdu brzy na jaře + před květem (na list)



BYLINKY (pažitka, máta, šalvěj, libeček ...)

Dávka přípravku: 0,4 ml | **Objem vody:** 1,5 - 2,5 L | **Plocha:** 100 m² | **Další údaje k aplikaci od:** po obnově jarní vegetace
Škodlivý organismus: Listové skvrnitosti (altenária, septoria, helmintosporia)



RŮŽE

Dávka přípravku: 0,7 ml | **Objem vody:** 1,5 - 2,5 L | **Plocha:** 100 m² | **Další údaje k aplikaci od:** zjara, při obnově růstu (5-10cm nové přírůstky)
Škodlivý organismus: Rez růží, padlí růží, černá skvrnitost listů růží



JÁDROVINY

Dávka přípravku: 1,0 ml | **Objem vody:** 1,5 - 2,5 L | **Plocha:** 100 m² | **Další údaje k aplikaci od:** květ ve fázi „myši ouško“
Škodlivý organismus: Strupovitost jabloně, padlí jabloňové



PECKOVINY (švestky, broskve, meruňky....)

Dávka přípravku: 2,0 ml | **Objem vody:** 1,5 - 2,5 L | **Plocha:** 100 m² | **Další údaje k aplikaci od:** počátek kvetení
Škodlivý organismus: Strupovitost peckovin, moniliová hniloba peckovin, padlí broskvoně