




MAYLINE INVESTMENT CORPORATION LIMITED | Bílkova 855/19 Staré Město, Praha, 110 00 Česká republika
Tel: +420 773 550 670 / +420 724 106 607 / +420 775 940 078 / +420 773 730 567 | email: info@albitcz.eu | www.albitcz.eu



albit®
POMOCNÝ ROSTLINNÝ PŘÍPRAVEK



**EFEKTIVNÍ
PODPORA
VÝŽIVY
CUKROVÉ
ŘEPY
BIOLOGICKÝM
PŘÍPRAVKEM
ALBIT®**

ALBIT® PROSTĚ UMÍ !



POZITIVNÍ ÚČINEK APLIKACE ALBIT®

Nejnovější pokusy a výzkumy s přípravkem **ALBIT®** spolehlivě prokázaly významné **pozitivní účinky při použití vhodných pomocných půdních látek a biostimulantů pro podporu výživy cukrové řepy**. Hlavní prokázané přínosy z kombinace a společné aplikace ALBITU a speciálních listových hnojiv INFOSFOR Bór nebo LAMAG, jsou zejména :

- ✓ Rychlý nárůst nových listů v závěrečné vegetační fázi cukrové řepy, (v období konec srpna a září), s výrazným nárůstem velikosti čepelí listů (asimilační listové plochy)
- ✓ I v důsledku efektivní novotvorby listů se podstatně zvýší dosahovaná cukernatost, při současném snížení podílů K, Na a amino – N
- ✓ Při vyšším obsahu cukru v bulvách se získávají zajímavější ceny při jejich prodeji
- ✓ Díky účinkům ALBITU v kombinaci s uvedenými hnojivy se na dobu 40 dní vůbec neobjevily listové choroby a zvýšila se odolnost proti houbovým chorobám i během celého dozrávání cukrovky (s efektem reálného snižování nákladů na ochranu rostlin)
- ✓ Významně se zvyšuje i odolnost bulv při skladování proti suché nebo srdíčkové hnilobě
- ✓ Reálným dosahováním lepších výnosů efektivnější výživou rostlin
- ✓ Albit je možné efektivně používat i spolu s jinými pesticidy nebo hnojivy

5 HLAVNÍCH DŮVODŮ, PROČ JE ALBIT® VÝBORNÝM POMOCNÍKEM ZEMĚDĚLCŮ

POUŽÍVÁNÍ ALBITU SPOLEHLIVĚ POMÁHÁ:

1. Ke zvýšení výnosů cukrové řepy o 10% a více
2. K lepší cukernatosti (v % pův.hm.) o 1 – 2,5 %
3. K nižším ztrátám při skladování bulv o 5 – 10 %
4. Při omezování nákladů na fungicidy k jejich úspoře o >10 %
5. Vyrovnává případný herbicidní stres při souběhu nepříznivých podmínek

DOPORUČOVANÁ DÁVKA PRO ALBIT® PRO CUKROVKU 75 ml/ha